

LA VACCINATION AU SECONDAIRE



CETTE PRÉSENTATION S'ADRESSE AUX ÉLÈVES DE SECONDAIRE 3-4-5



LE CONSENTEMENT

- Lorsque tu as 14 ans et plus, tu n'as plus besoin de tes parents pour consentir à des soins. Tu peux donner ton consentement à des vaccins de façon autonome!




VACCINS POUR LES ÉLÈVES DE SECONDAIRE 3, 4 ET 5

Voici les vaccins recommandés selon ton niveau:

Pour les élèves de secondaire 3: diphtérie-tétanos, méningite C

Pour les élèves de secondaire 4: diphtérie-tétanos, méningite C et VPH 9 (pour les garçons et filles qui ne l'ont pas reçu en 4^{ème} année.

Pour les élèves de secondaire 5: VPH 2 (2^e dose)



dT – diphtérie et tétanos

La diphtérie est causée par une bactérie qui touche les muqueuses respiratoires. Elle peut occasionner des troubles : respiratoires, cardiaques et dermatologiques.

Le tétanos est une maladie causée par une bactérie qui provoque des contractions incontrôlables des muscles.

Infection au Méningocoque du groupe C

Peut provoquer une maladie qui s'appelle la méningite (inflammation des méninges).



VPH (virus du papillome humain)

Peut provoquer des cancers génitaux et des condylomes chez les filles et les garçons.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce qu'il te faut d'ici le jour de ta vaccination:



- Ton carnet de vaccination (peu importe la couleur)
- Avoir bien lu les feuilles d'explications sur les vaccins et leurs effets secondaires
- Demander à tes parents si tu as eu le vaccin contre la varicelle ou si tu as fait la maladie, si oui, à quel âge



Comment ça se déroule:



1. Élève par élève, tu vas t'asseoir avec une infirmière qui évalue les vaccins manquants et c'est elle qui te confirme ce qu'il te manque (peut être plus que les vaccins recommandés selon ton âge)
2. Tu te fais vacciner à une autre station avec d'autres infirmières
3. Tu attends 15 min après les vaccins ou jusqu'à ce que ton groupe termine



EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

- ✓ Douleur/rougeur/lourdeur au site d'injection
- ✓ Fatigue
- ✓ Fièvre
- ✓ Douleurs musculaires
- ✓ Après les vaccins : reprise des activités habituelles, Ibuprofène/Acétaminophène et compresses froides au besoin



Conseils de pro:

- ✓ Bien manger au déjeuner
- ✓ Arriver bien préparé
- ✓ Mettre un chandail à manches courtes



MERCI ET AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER!



Diane



Marianne B.



Geneviève



Marianne S.